

## Promanum® pure – mit speziellem Rückfettersystem

### Eigenschaften

- gebrauchsfertiges alkoholisches Händedesinfektionsmittel
- DGHM-/VAH-gelistet und in der IHO-Viruzidie-Liste aufgeführt
- wirksam gegen Bakterien (inkl. MRSA, TbB) und Pilze
- Viruswirksamkeit: begrenzt viruzid (inkl. HBV, HCV, HIV), wirksam gegen Rota-, Adeno- und Noroviren innerhalb der hygienischen Händedesinfektion (30 Sekunden)
- mit ausgesuchten Rückfetttern ausgestattet
- farbstoff- und parfümfrei
- hygienische Händedesinfektion gem. EN 1500 innerhalb von 15 Sekunden\*
- chirurgische Händedesinfektion gem. EN 12791 in nur 60 Sekunden

\* Für die hygienische Händedesinfektion ist mindestens eine Einwirkzeit von 30 Sek. einzuhalten.

+  
farbstoff- und  
parfümfrei



### Wirkungsspektrum/Einwirkzeiten (EZ)

Lieferform	REF	PZN	Einsatzgebiet	EZ
100 ml-Flasche	19591	08815842	hygienische Händedesinfektion	30 Sek.
500 ml-Spenderflasche	19592	08815948	chirurgische Händedesinfektion	90 Sek.
1000 ml-Spenderflasche	19593	08815977	tuberkulozid**	15 Sek.
5 Liter-Kanister	19594	08816008	MRSA	15 Sek.
Dosierpumpe für 500 ml-Spenderflasche	3908380	05486622	Herpes simplex	15 Sek.
Dosierpumpe für 1000 ml-Spenderflasche	3908381	05486651	begrenzt viruzid (inkl. HBV, HIV, HCV)	15 Sek.
Wandspender plus ELS für 500 ml-Spenderflasche	1418894	04706872	Rotaviren	15 Sek.
Wandspender plus TLS für 1000 ml-Spenderflasche	1418895	04706889	Adenoviren	30 Sek.
			Noroviren***	15 Sek.

\*\* Nach Vorgabe des RKI soll bei der Kontamination mit Mykobakterien die hygienische Händedesinfektion 2-mal durchgeführt werden.

\*\*\* Surrogatvirus MNV

### Promanum® pure – Inhaltsstoffe

100 g Lösung enthalten Wirkstoffe: Ethanol (100 %) 73,4 g, 2-Propanol 10,0 g; sonstige Bestandteile: gereinigtes Wasser, Isopropylmyristat, Butan-2-on, Sorbitol, (Hexadecyl, octadecyl)[(RS)-2-ethylhexanoat], Povidon K 30.

# Promanum<sup>®</sup> pure

## Zusammensetzung:

100 g Lösung enthalten:

### *Wirkstoffe*

Ethanol (100%) 73,4 g, 2-Propanol (Ph. Eur.) 10,0 g

### *Sonstige Bestandteile*

Gereinigtes Wasser, Isopropylmyristat (Ph. Eur.), Butan-2-ol, Sorbitol (Ph. Eur.), (Hexadecyl,octadecyl)[(RS)-2-ethylhexanoat], Povidon K 30.

## Anwendungsgebiete:

Hygienische und chirurgische Händedesinfektion

## Gegenanzeigen:

Überempfindlichkeit (Allergie) gegenüber Ethanol oder 2-Propanol oder einen der sonstigen Bestandteile.

## Nebenwirkungen:

Kontaktallergie. Hautirritationen wie Rötung und Brennen insbesondere bei häufiger Anwendung.

## Warnhinweise:

Leichtentzündlich.

Behälter dicht geschlossen halten.

Von Zündquellen fernhalten. - Nicht rauchen!

Nicht in die Augen bringen. Nicht auf verletzter Haut oder auf Schleimhäuten anwenden.

Nur zur äußerlichen Anwendung.

14 °C Flammpunkt nach DIN 51755.

## Stand der Information

03/2012

## Pharmazeutischer Unternehmer:

B. Braun Melsungen AG  
34209 Melsungen